

Diskrete Strukturen und Logik

WiSe 2007/08 in Trier

Henning Fernau

Universität Trier

fernau@uni-trier.de

Diskrete Strukturen und Logik

Gesamtübersicht

- Organisatorisches
- Einführung
- **Logik** & Mengenlehre
- Beweisverfahren
- Kombinatorik: Die Kunst des Zählens
- algebraische Strukturen

aus der letzten Vorlesung

Aussagen und Aussageformen

Verknüpfung von Aussagen (Junktoren)

einfache Rechenregeln

skizzierte Anwendung: Programmverifikation

... heute (und morgen) ...

Tautologien und Kontradiktionen

Prädikatenlogik

Aussageverbindungen

Sind p_1, \dots, p_n Aussagen, so können wir diese unter Verwendung der vorher eingeführten Verknüpfungen zu einer sog. **Aussageverbindung** $a(p_1, \dots, p_n)$ kombinieren.

Im Allgemeinen gilt: Abhängig von den Wahrheitswerten der Aussagen p_i kann man $a(p_1, \dots, p_n)$ somit einen Wahrheitswert zuordnen.

Beispiel: $a(p, q) = ((p \vee \neg q) \wedge (p \implies q))$ ist wahr, falls p und q wahr sind, aber falsch, falls p wahr und q falsch ist.

Tautologien und Kontradiktionen

Eine Aussageverbindung $\alpha(p_1, \dots, p_n)$ von n Aussagen p_1, p_2, \dots, p_n heißt *Tautologie* (bzw. *Kontradiktion*), wenn sie unabhängig von den Wahrheitswerten der Aussagen p_i stets wahr (bzw. falsch) ist.

Beispiel: $p \vee \neg p$: *Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten* Tautologie

Beispiel: $p \wedge \neg p$: *Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch* Kontradiktion

Beweis: Wahrheitstafel !

Beispiel: $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) \iff (p \iff q)$ Tautologie

Hinweis: Äquivalenzen beweist man daher durch Nachrechnen von zwei Implikationsrichtungen.

Beispiele für Tautologien

1. $(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow \neg p$

2. $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$

3. $(p \wedge q) \Rightarrow p, (p \wedge q) \Rightarrow q$

4. $p \Rightarrow (p \vee q), q \Rightarrow (p \vee q)$

5. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow [(q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)]$

6. $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \wedge p) \Rightarrow r$

Hinweis: Beweisverfahren fußen oft auf Tautologien.

Beweise für Tautologien Z.B. 5. mit (kombinierter, gekürzter) Wahrheitstafel

p	q	r	$A = p \Rightarrow q$	$B = q \Rightarrow r$	$C = p \Rightarrow r$	$D = B \Rightarrow C$	$A \Rightarrow D$
w	w	w	w	w	w	w	w
w	w	f	w	f	f	w	w
w	f	?	f	?	?	?	w
f	w	w	w	w	w	w	w
f	w	f	w	f	w	w	w
f	f	?	w	w	w	w	w

“Abkürzungsregel:” Ist die Prämisse falsch, so ist die Implikation wahr.

Logische Äquivalenz von Aussageverbindungen

Zwei Aussageverbindungen $a_1(p_1, \dots, p_n)$ und $a_2(p_1, \dots, p_n)$ mit denselben Aussagen p_1, \dots, p_n heißen *logisch äquivalent*, falls die Aussageverbindung

$$a_1(p_1, \dots, p_n) \iff a_2(p_1, \dots, p_n)$$

eine Tautologie ist.

Schreibweise: $a_1(p_1, \dots, p_n) \equiv a_2(p_1, \dots, p_n)$

Viele bislang gefundene Rechenregeln und Tautologien lassen sich so schreiben (s. nächste Folie).

Logische Äquivalenzen — Beispiele

1. Kommutativgesetze: $(p \wedge q) \equiv (q \wedge p)$; $(p \vee q) \equiv (q \vee p)$.
2. Assoziativgesetze: $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r)$; $(p \vee (q \vee r)) \equiv ((p \vee q) \vee r)$.
3. Distributivgesetze: $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$; $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$.
4. Gesetze von de Morgan: $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p \vee \neg q)$; $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$.
5. Identitätsgesetze: $(p \vee f) \equiv p$, $(p \wedge t) \equiv p$.
6. Umkehrschluss: $(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p)$.
7. Auflösen der Implikation: $(p \Rightarrow q) \equiv (\neg p \vee q)$.
8. Auflösen der Äquivalenz: $(p \iff q) \equiv ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.

Logische Äquivalenzen — Beweise

1. Wahrheitstafelbeweis (vollständige Fallunterscheidung), z.B. für Umkehrschluss

2. Ausnutzung bekannter Tautologien (also durch Umformungen), z.B. für 8b:

$$\begin{aligned}(p \iff q) &\equiv^{8a} ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)) \\ &\equiv^7 ((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \\ &\equiv^3 ((\neg p \vee q) \wedge \neg q) \vee ((\neg p \vee q) \wedge p) \\ &\equiv^{1,3} ((\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q)) \vee ((\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)) \\ &\equiv^{1,2,5} (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)\end{aligned}$$

Noch mehr logische Äquivalenzen

1. $((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow q)) \equiv (p \vee r) \Rightarrow q.$
2. $(p \vee (q \wedge \neg q)) \equiv p;$
 $(p \wedge (q \vee \neg q)) \equiv p.$
3. Dominanz: $p \wedge f \equiv f; p \vee t \equiv t.$
4. Negationsgesetze: $p \wedge \neg p \equiv f; p \vee \neg p \equiv t.$
5. Doppelte Negation: $\neg\neg p \equiv p.$
6. Idempotenzgesetze: $p \wedge p \equiv p; p \vee p \equiv p.$
7. Absorptionsgesetze: $(p \wedge (p \vee q)) \equiv p; (p \vee (p \wedge q)) \equiv p.$

Abtrennungsregel *modus ponens* (Schlussketten)

Ist p wahr sowie $p \Rightarrow q$, so auch q .

In Zeichen: $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$. (z.B.: Wahrheitstafelbeweis)

Sind allgemein p_1, \dots, p_n Aussagen und
sind p_1 und $p_i \Rightarrow p_{i+1}$ wahr für $i = 1, \dots, n - 1$,
so ist p_n wahr.

Hierfür schreibt man abkürzend (wenn auch nicht ganz korrekt):

$$(p_1 \wedge (p_1 \Rightarrow p_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow p_n)) \Rightarrow p_n$$

Ähnlich notiert man manchmal Ketten von Äquivalenzen (s.o.(!))

Eine Knobelaufgabe

Gespensterknobelei

Die entsprechenden Dateien finden Sie original hier.

Aufgabe: Wie können wir das Problem modellieren und lösen ?